

表三：乾粉製劑溶解後保存期限

藥品	室溫 (15~30°C)	冷藏 (2~8°C)	藥品	室溫 (15~30°C)	冷藏 (2~8°C)
Acyclovir	立即使用	—	Lysine Acetylsalicylate	立即使用	—
Amphotericin B	1天	7天	Meropenem(台廠)	6小時	1天
Ampicillin	1小時	—	Meropenem(原廠)	1天	7天
Augmentin	4小時	—	Methylprednisolone	2天	—
Cefazolin	2天	4天	Micafungin	1天	—
Cefepime	1天	7天	Oxacillin	3天	7天
Ceftriaxone	6小時	1天	Parecoxib	立即使用	—
Cefuroxime	1天	2天	Penicillin G Benzathine	立即使用	—
Colistin	7天	14天	Piperacillin	1天	2天
Daptomycin	12小時	2天	Rocuronium	1天	—
Doripenem	NS為溶劑12小時	1天	Somatropin	—	28天
	D5W為溶劑4小時	1天	Streptomycin	避光7天	—
Esomeprazole	立即使用	—	Tazocoin/Pisutam	1天	7天
Flomoxef	6小時	1天	Teicoplanin	—	1天
Hydrocortisone	避光3天	—	Vancomycin	—	14天