

表四：需使用輸液幫浦

藥品	on iv pump	if continous infusion
Amiodarone	<input checked="" type="checkbox"/>	—
Atracurium	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Dobutamine	<input checked="" type="checkbox"/>	—
Dopamine	<input checked="" type="checkbox"/>	—
Furosedmide	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Heparin	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Midazolam	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Nicadipine	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Nitroglycerine	<input checked="" type="checkbox"/>	—
Norepinephrine	<input checked="" type="checkbox"/>	—
NovoRapid	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Propofol	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Rocuronium	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Sodium chloride 3%	<input checked="" type="checkbox"/>	—

表五：需使用粗靜脈輸注

藥品	來源
Amiodarone	濃度>2 mg/ml
Calcium Chloride	仿單建議
Ciprofloxacin	仿單建議
Diazepam	仿單建議
Dopamine	仿單建議
Gabexate	仿單建議
Norepinephrine	仿單建議
Phenytoin	強鹼藥品
Sodium chloride 3%	高張溶液