

# 用藥指導單- Romosozumab (Evenity®)

## 藥品名稱/外觀

- **藥品名**：益穩挺注射液
- **藥品劑量**：105 毫克/注射針(1 盒 2 隻注射針)
- **藥品作用**：為一種單株抗體，可抑制硬化蛋白活性，減少骨質流失，促進骨生成，治療骨質疏鬆。



## 施打時間

- 每個月皮下施打一次，一次兩針。
- 注射部位：腹部、大腿或上臂(皮下脂肪豐富處)。每次注射選擇不同部位，以避免注射部位不適。
- 治療期間最多12 個月，停藥後若仍需繼續治療骨質疏鬆症，可考慮其他的抗骨質吸收劑。(如：保路麗、骨維壯)

## 注意事項



- 治療期間每日補充 1000 毫克的鈣質與至少 400 國際單位的維生素 D，並避免抽菸、減少酒精或咖啡的攝取。



- 接受治療前，應先進行**牙齒檢查**。治療期間請保持個人**口腔衛生**，並定期做口腔檢查。
- 若有牙齒、口腔不適或進行牙科治療(如拔牙、牙科手術)前，請先告知牙醫師您正在使用此藥品。



- 使用本藥可能增加發生**心臟嚴重不良事件**的風險。
- 過去一年曾發生**心肌梗塞、中風**或有其他**心血管疾病**，請先告知醫師。

## 忘記服藥怎麼辦？

- 如果漏打一次，應安排門診時間儘快施打。之後再從最後一次注射日期算起，重新排定每個月的施打時間。

## 副作用及處理方式

- 副作用包括：過敏反應、頭痛、關節痛、注射部位疼痛或紅斑、噁心等。
- 如果出現以下症狀，應立即就醫：



### 過敏反應

(皮膚炎、皮疹、眼皮水腫)

### 心肌梗塞、中風

(胸悶、胸痛等)、  
(嚴重頭痛、單側肌肉無力、步態不穩)

### 口腔牙齦疼痛

(牙齦腫脹、化膿或牙齒傷口無法癒合)

### 骨頭疼痛

(大腿、髖部、腹股溝疼痛、嚴重關節或肌肉疼痛)

## 用藥小叮嚀

定時每月施打一次，  
治療期間注意心肌梗塞或中風的表徵或症狀，  
保持口腔衛生，適當補充鈣質及維生素 D。

健仁醫院藥劑科 關心您  
藥物諮詢專線 ☎(07)3529004 或 3517166 轉 1121、1123