

用藥指導單-Digoxin

藥品資訊

- 藥品名稱/外觀：digoxin (隆我心)
- 藥品劑量：0.25 毫克/錠
- 藥品作用：增加心臟收縮力，改善心臟衰竭，降低心臟傳導速率，治療心律不整。



副作用及處理方式

- 可能副作用：腹瀉、食慾不佳、噁心、嘔吐、頭痛、對光敏感(畏光)、疲倦想睡、皮膚紅疹。
- 服藥時間發生以下狀況，請立即回診：



忘記服藥怎麼辦？

- 距離服藥時間在 1 天內：立即補服當日藥量。
- 距離服藥時間超過 1 天：不須補服，隔日正常服藥。
- 距離服藥時間超過兩天：請回院求診並告知醫師。

用藥注意事項

- 可能會引起眩暈，初期服用或劑量調整時，應小心駕車或操作具危險性機械。
- 應將藥物放置於室內，避免太陽直射，且小孩無法拿到的地方。
- 若您計畫懷孕、可能懷孕或哺乳，請先告知您的醫師。

影響藥物療效

- 要併用其他藥物或成藥，請先諮詢醫師或藥師。
- 使用下列藥物時請告知醫師，以便監測藥效及調整劑量：心律不整治療藥物、心血管用藥(鈣離子阻斷劑、乙型阻斷劑)、抗生素(四環黴素、紅黴素)、利尿劑。

用藥小叮嚀

定時服藥，不建議自行服用其他藥物，
注意是否有心跳不規則及視覺異常情況。

健仁醫院藥劑科 關心您
藥物諮詢專線 ☎(07)3529004 或 3517166 轉 1121、1123