

用藥指導單

-Edoxaban / Rivaroxaban

藥品名稱/外觀

<p>□里先安 (30mg) 顏色：粉色</p> 	<p>□里先安 (60mg) 顏色：黃色</p> 	<p>□拜瑞妥 (15mg) 顏色：紅色</p> 	<p>□拜瑞妥 (20mg) 顏色：紅棕色</p> 
--	--	---	---

藥品作用：抗凝血劑，能減少血栓形成的風險，可預防心房纖維顫動所造成之中風與全身性栓塞。

副作用及處理方式

- 若以下症狀，宜立即回診。

			
不正常出血	嚴重頭痛/肢體無力	口齒不清	身體平衡改變

不正常出血包括：解黑便、血尿、血尿、咳血、皮膚瘀青、牙齦出血、流鼻血。

忘記服藥怎麼辦？

- 距離服藥時間在一天內：立即補服當日藥量。
- 距離服藥時間超過一天：不須補服，隔日正常服藥。
- 距離服藥時間超過兩天：請回院求診並告知醫師。

用藥注意事項

- 須牙科或手術治療請告知醫師，由醫師判斷停藥時間。
- 減少受傷出血機會（如：以軟毛牙刷取代硬毛牙刷、避免衝撞型劇烈運動）。
- 若服用期間懷孕或正在哺乳中，需告知醫師。

影響藥物療效

- 服藥期間，應避免食用中草藥或保健食品(如蔓越莓、輔酶 Q10、大蒜精、當歸、丹參、銀杏、人參等)。
- 使用下列藥物時請告知醫師，以便監測藥效及調整劑量：消炎止痛藥、抗血小板藥物、抗憂鬱藥物。

用藥小叮嚀

**定時服藥，不可自行服用其他藥物或保健食品，
注意是否有異常出血。**

健仁醫院藥劑科 關心您
藥物諮詢專線 ☎(07)3529004 或 3517166 轉 1121、1123