

抗凝血藥物-Edoxaban (里先安)

【商品名】 Lixiana (里先安膜衣錠)

【含量】 每錠含 30 毫克、60 毫克

【藥品作用】 抑制凝血因子的合成，達到抗凝血效果。

【注意事項】

1. 依照醫師處方劑量定時服藥。

2. 忘記服藥的處理：

想起來時盡速補服；若已到下次服藥時間，只需服用當次藥量，勿服用雙倍藥量。

3. 服藥期間須牙科或手術治療者，請告知醫師。

4. 服用此藥期間，應避免食用中草藥或保健食品(如蔓越莓、輔酶 Q10、大蒜精、當歸、丹參、銀杏、人參等)。

5. 使用下列藥物時請告知醫師，以便監測藥效及調整劑量：

其他抗凝血劑、消炎止痛藥、抗血小板藥物如阿斯匹靈(Aspirin)、舒栓寧(Clopidogrel)、腦康平(Aggrenox)、抗憂鬱藥物。

6. 如有下列情形，宜立即回診。

① 異常出血：牙齦出血、流鼻血、咳血、粉紅色或棕色尿、解黑便或血便、陰道出血、不明原因瘀傷。

② 突然發生的視力模糊、嚴重頭痛單側肢體無力、口齒不清、身體平衡改變。

7. 請避免進行任何具有高危險性會導致損傷出血的活動，以免大量出血。

8. 應將藥物存放於室溫、避免陽光直射且小孩無法拿到的地方。

病人優先、專業導向、全人照護、安全第一、永續經營

健仁醫院藥劑科 藥物諮詢專線 ☎(07)3529004 或 3517166 分機 1121、1123