

# 定量噴霧吸入劑(MDI)

**【藥品名稱】** ①Ipratropium+Fenoterol ②Budesonide ③Formoterol+Budesonide

**【適應症】** 氣喘、慢性阻塞性肺病

**【使用方法】**

1. 打開防塵蓋(②Budesonide 須接上 spacer)。
2. 充分搖晃 10 下(③Formoterol+Budesonide 搖晃 5 秒)。
3. 第一次使用需排氣：
  - ①Ipratropium+Fenoterol 和 ②Budesonide：對空噴二次。
  - ③ Formoterol+Budesonide：對空噴第一次，再搖晃 5 秒，對空噴第二次。
4. 向外吐氣→含住吸嘴→按壓並同時緩慢深吸氣→移開吸嘴→閉氣 10 秒→正常呼吸。
5. 蓋回防塵蓋。
6. 若需使用兩次劑量，至少間隔 30 秒再使用第二次。

## 【注意事項】

### 1. 副作用及處理方式：

- 1.1 含支氣管擴張劑可能會心悸、顫抖、頭痛、口乾等。
- 1.2 含類固醇製劑可能會造成口腔念珠菌感染等，因此使用後請漱口。
- 1.3 若以上症狀持續/加重，應立即回診。

### 2. 使用後用乾布或衛生紙將吸嘴擦乾。

### 3. 三天以上未使用：

- ① Ipratropium+Fenoterol 和 ② Budesonide：搖勻後，對空噴出一次劑量再使用。
- ③ Formoterol+Budesonide：依【使用方法】第 2、3 點。

### 4. 藥罐剩藥之測試：

- ① Ipratropium+Fenoterol 和 ② Budesonide：搖晃瓶身有液體存在。
- ③ Formoterol+Budesonide：有計數視窗。

病人優先、專業導向、全人照護、安全第一、永續經營

健仁醫院藥劑科 藥物諮詢專線 ☎(07)3529004 或 3517166 分機 1121、1123