

# 乾粉吸入劑-易利達

**【藥品名稱】** Fluticasone + Vilanterol

**【適應症】** 慢性阻塞性肺病之維持治療、氣喘

**【使用方法】**

1. **打開:**計量視窗面對自己，把蓋子往下推，直到聽見”喀嚓”聲，計數器數字自動遞減，即完成一次劑量的充填。
2. **吸入:**向外吐氣→確實含住吸嘴→以長而穩定的方式深吸一口氣【手指勿擋住通氣孔】→移開吸嘴→閉氣 3~4 秒→緩慢吐氣。
3. **關上:**將蓋子往上推，確實蓋住吸嘴【需要時可用乾面紙清潔吸口】。
4. **漱口:**務必以清水漱口，且不可吞下，以降低口咽念珠菌感染。

## 【注意事項】

1. 僅用於維持治療，不可用於急性發作之治療。
2. 忘記服藥的處理：  
想起來時，儘快補用一次劑量；若已接近下次用藥時間，則不補用，不要一次使用雙倍藥量。
3. 即使正確吸入，可能無法嚐到或感覺到藥物。
4. 若打開蓋子，未吸入藥物就關上，會損失一次劑量，下次使用不會吸入兩次劑量；可用劑量<10次時，計數器左邊會呈現紅色。
5. 副作用及處理方式：  
可能發生鼻咽炎、上呼吸道感染、口咽念珠菌感染；極少數會有過敏反應，此時應立即回診。

病人優先、專業導向、全人照護、安全第一、永續經營

健仁醫院藥劑科 藥物諮詢專線 ☎(07)3529004 或 3517166 分機 1121、1123