

抗凝血藥物-Warfarin

 健仁醫院藥劑科
修訂日期 1080129

【藥品名】 Warfarin

【藥品劑量】 每錠含 1 或 5 毫克

【藥品作用】

抑制部份凝血因子的合成，達到抗凝血效果。治療腦部、心臟、肺臟及周邊血管的血栓性疾病。

【注意事項】

1. 依照醫師處方劑量定時服藥。
2. 忘記服藥的處理：
 - ①距離服藥時間在一天之內：立即補服當日藥量。
 - ②距離服藥時間超過一天：不須補服當日藥量，隔日正常服藥。
 - ③距離服藥時間超過兩天：請回院求診並告知醫師。
3. 治療期間不宜飲酒，避免大量攝取富含維生素 K 的食物如：豬肝、

綠色蔬菜(參考「增加/減少 Warfarin 作用的食物/藥物/中草藥」指導單)。

4. 服藥期間須牙科或手術治療者，請告知醫師。
5. 調整生活習慣，減少受傷出血機會，如：避免衝撞型劇烈運動、改用軟毛牙刷或電動刮鬍刀等...
6. 使用下列藥物時請告知醫師，以便監測藥效及調整劑量：
心血管用藥 (aspirin、amiodarone、clopidogrel、ubidecarenone)、抗
黴菌藥、抗生素(四環黴素、紅黴素、metronidazole、cotrimoxazole)、
甲狀腺治療藥、cimetidine、ginkgo biloba、danazole。
7. 藥物的副作用及處理方式：
 - ①可能發生頭痛、胃不舒服、腹瀉、發燒、皮膚疹、脫髮等症狀。
 - ②若發生以下症狀時應立即就醫：不正常出血、解黑便、血尿、咳血、皮膚出現瘀傷、牙齦出血、流鼻血、傷口出血時間延長。

病人優先、專業導向、全人照護、安全第一、永續經營

健仁醫院藥劑科 藥物諮詢專線 ☎(07)3529004 或 3517166 分機 1121、1123