

本院不宜剝半或磨粉之藥品

腸溶劑型 Enteric-Coated Forms	
Aspirin	可打開膠囊，不可磨粉/嚼碎
Bisacodyl	不可磨粉/嚼碎，建議使用其他軟便劑
Broen-C	不可磨粉/嚼碎
Doxycycline	可打開膠囊，不可磨粉/嚼碎
Duloxetine	不可打開膠囊/磨粉
Esomeprazole	不可磨粉/嚼碎，可用冷開水溶解
Mesalazine	不可磨粉/嚼碎
Omeprazole	可打開膠囊服用，微粒不可咬嚼或壓碎
Pantoprazole	不可剝半/磨粉，建議改用其他口服 PPI
Sulfasalazine	不可磨粉/嚼碎
Stazyme	不可磨粉/嚼碎
持續釋放劑型 Sustained Released Forms	
Depakine Chrono 500mg	可剝半，不可磨粉/嚼碎，建議使用 Valproic acid solution
Diltiazem 180 mg	可打開膠囊，不可磨粉/嚼碎，建議使用 Amlodipine/ lacidipine
Dihydroergotamine	可打開膠囊，不可磨粉/嚼碎，建議使用 Ergoton
Doxazosin	不可剝半/磨粉，建議使用其他血壓/攝護腺藥物
Indapamide	不可剝半/磨粉，建議使用其他利尿劑
Isorsobide-5-mononitrate	可剝半，不可磨粉/嚼碎，建議使用 Nicorandil
Linicor	不可磨粉/嚼碎，建議使用其他降血脂藥
LoraPseudo	不可剝半/磨粉
Metformin (緩釋劑型)	建議使用直接釋放劑型
Mirabegron	不可剝半/磨粉，建議使用 Propiverine
Nifedipine 30 mg	不可剝半/磨粉，建議使用 Amlodipine/ lacidipine
Oxybutynin	可剝半，不可磨粉/嚼碎
Pentoxifylline	可剝半，不可磨粉/嚼碎，建議使用 Nicametate
Ropinirole 2mg	不可剝半/磨粉
Tamsulosin	可打開膠囊，不可磨粉/嚼碎
Theophylline	可打開膠囊，不可磨粉/嚼碎
Venlafaxine	可打開膠囊，不可磨粉/嚼碎
Verapamil	可剝半，不可磨粉
Xigduo	不可磨粉/嚼碎，建議使用單方製劑
懷孕分級 X 之藥品	
Azathioprine	(1) 應避免由懷孕人員操作或應有防護裝備。
Methotrexate	(2) 若須磨粉建議處理方式： ◎溶解:將藥品整個浸泡在可以密封的容器，必要時搖晃加速溶解。 ◎搗碎:將藥品置於厚實的透明塑膠袋內，搗碎後加水成為液態，以避免藥品粉末飛散或外濺。
其它不宜磨粉之藥品	
Acetylcysteine 600mg	溶於 60-100 mL 的白開水再服用
Alendronate	具刺激性，導致上腸胃道粘膜受損
Anbycin	不宜剝半/磨粉，因本品易潮解
Benzonatate	軟膠囊劑型，會造成口腔黏膜麻醉
Calcitriol	軟膠囊劑型，將膠囊刺破取出藥物與水混合後使用
Cinacalcet	不可剝半/磨粉

Dutasteride	具刺激性，不可咀嚼或打開膠囊
Duodart	具刺激性，不可咀嚼或打開膠囊
Epclusa	不宜剝半/磨粉，因本品帶有苦味
Fluconazole 50,150mg	不可剝半/磨粉
Levofloxacin	可剝半，不可磨粉
Maviret	不可剝半/磨粉
Melatonin	不可剝半/磨粉
Nitroglycerin	舌下錠
Odefsey	不可剝半/磨粉
Paxlovid	不可剝半/磨粉，可分開製備懸浮液給予管灌
Pinaverium	不可口含或咀嚼，以免導致食道損害
Propafenone	苦味及口內麻木感
Progesterone	軟膠囊劑型，將膠囊刺破取出藥物與水混合後使用
Qtern	不可剝半/磨粉，建議使用單方製劑
Rivastigmine 1.5mg, 3mg	可打開膠囊，不可磨粉/嚼碎
Strocaïne	刺激粘膜，產生口內麻木感
Semaglutide 7mg, 14mg	不可剝半/磨粉
Tadalafil	不可剝半/磨粉

每年修訂後須執行事項	1. 系統管控：①不可為”非整粒”開立 ②開立磨粉時會鎖控	藥管組	完 成 者 請 打 勾	
	2. 藥袋提示	臨藥組		
	3. 藥名註記不可磨粉	藥管組		
	4. 藥品儲存位置張貼【不可磨粉】貼紙	5S 專責藥師		