

表三：乾粉製劑溶解後保存期限

藥品	室溫	冷藏	藥品	室溫	冷藏
	(15~30°C)	(2~8°C)		(15~30°C)	(2~8°C)
Acyclovir	立即使用	—	Micafungin	1天	—
Augmentin	4小時	8小時	Oxacillin	3天	7天
Brosym	6小時	2天	Pantoprazole	12小時	—
Cefazolin	2天	4天	Parecoxib	立即使用(12小時)	—
Cefepime	1天	7天	Penicillin G Benzathine	立即使用	—
Ceftriaxone	6小時	1天	Tazocoin/Pisutam	1天	2天
Ceftaroline	6小時	12小時	Propacetamol	30分鐘	—
Daptomycin	12小時	2天	Polymyxin B	—	3天
Ertapenem	6小時	1天(離開冷藏後4小時)	Remdesivir	1天	2天
Flomoxef	6小時	1天	Rocuronium	1天	—
Hepatitis A Vaccine	3天	—	Respiratory syncytial virus vaccine	4小時	4小時
Hepatitis B Vaccine	7天	—	Somatropin	—	28天
Hydrocortisone	避光3天	—	Teicoplanin	—	1天
Herpes zoster vaccine	—	6小時	Tigecycline	1天	2天
Leuprorelin Acetate	立即使用	—	Triptorelin	立即使用	—
Meropenem(台廠)	6小時	1天	Vancomycin	—	14天
Meropenem(原廠)	1天	7天	Varicella Virus Vaccine	30分鐘	—
Methylprednisolone	2天	—	Zavicefta	4小時	12小時