

# 用藥指導單-Denosumab(Prolia<sup>®</sup>)

## 藥品名稱/外觀

- 藥品名：保骼麗注射液
- 藥品劑量：60 毫克
- 藥品作用：為一種單株抗體，作用於蝕骨細胞，減少骨質流失，治療骨質疏鬆。



## 施打時間

- 每 6 個月皮下注射 1 劑(注射部位：上臂、大腿或腹部)。
- 治療骨質疏鬆症的時間長短須與您的醫師進行討論。
- 此藥品停用後，骨密度會下降，增加骨折風險，因此勿自行停藥。

## 注意事項



- 治療期間每日補充 1000 毫克的鈣質與至少 400 國際單位的維生素 D。



- 避免抽菸、減少酒精或咖啡的攝取。



- 接受治療前，應先進行牙齒檢查，治療期間請保持個人口腔衛生，並定期做口腔檢查。
- 若有牙齒、口腔不適或執行牙科治療(如拔牙、牙科手術)前，請先告知牙醫師您正在使用此藥品。

## 忘記服藥怎麼辦？

- 如果漏打一次，應安排門診時間儘快施打。之後再從最後一次注射日期算起，重新排定每 6 個月一次的施打時間。

## 副作用及處理方式

- 副作用包括：過敏反應、頭痛、關節痛、注射部位疼痛或紅斑、噁心等。
- 如果出現以下症狀，應立即就醫：



### 過敏反應

(皮膚炎、皮疹、眼皮水腫)



### 低血鈣症狀

(肌肉痙攣、抽筋、抽搐或四肢麻木刺痛)



### 口腔牙齦疼痛

(牙齦腫脹、化膿或牙齒傷口無法癒合)



### 骨頭疼痛

(大腿、髌部或腹股溝疼痛或嚴重關節或肌肉疼痛)

## 用藥小叮嚀

每 6 月注射施打一次，切勿自行停藥，治療期間保持口腔衛生，適當補充鈣質及維生素 D。

健仁醫院藥劑科 關心您  
藥物諮詢專線 ☎(07)3529004 或 3517166 轉 1121、1123