


用藥指導單-Warfarin


藥品名稱/外觀



藥品作用：抗凝血作用，抑制部分凝血因子合成，治療腦部/心臟/肺部血栓性疾病。

副作用及處理方式


- 若以下症狀嚴重且持續，請立即就醫。




不正常出血



頭痛暈眩虛弱



腸胃不適



皮膚疹

- 不正常出血包括:解黑便、血尿、血尿、咳血、皮膚瘀青、牙齦出血、流鼻血。


忘記服藥怎麼辦？

- 距離服藥時間在一天內：立即補服當日藥量。
- 距離服藥時間超過一天：不須補服，隔日正常服藥。

影響藥物療效

- 避免大量增加或減少攝取富含維生素 K 的食物(如：豬肝、綠茶、深綠色蔬菜等)，因維生素 K 會降低藥物療效。
- 藥物之間可能發生交互作用，因而增/減抗凝血效果，所以不要自行停用目前服用藥物或自行服用其他藥物/保健食品/中藥。
- 請避免飲用酒精性飲料，會增加抗凝血作用。

維生素 K



用藥注意事項

- 須牙科或手術治療請告知醫師，由醫師判斷停藥時間。
- 減少受傷出血機會（如：以軟毛牙刷取代硬毛牙刷、避免衝撞型劇烈運動）。
- 若服用期間懷孕或正在哺乳中，需告知醫師。

用藥小叮嚀

維持均衡飲食，不可自行服用其他藥物，
注意是否有異常出血。

健仁醫院藥劑科 關心您
藥物諮詢專線 ☎(07)3529004 或 3517166 轉 1121、1123