

“應元” 仕 隆 眼藥水 4%
Suzole Eye Drops 4% “Y.Y.”

【成分】 Each ml contains :

Sulfamethoxazole40mg

賦形劑：

Sodium Hydroxide , Sodium Thiosulfate , Methylparaben ,
Sodium Borate Decahydrate , Boric Acid , Water for Injection 。

【作用】

1. 點眼時之眼房水樣體內移行
對家兔每 5 分鐘 點眼 5 次實驗之結果 經 1~2 小時後之眼房水中濃度為 35~40 μ g/ml，其眼內移行成績良好。
2. 動物毒性
 - (1) 急性毒性(LD₅₀ mg/kg)

		口服	腹腔注射	皮下注射
小白鼠	♂	3900	2300	>5000
	♀	3471	2450	>5000
大白鼠	♂	8640	2790	>5000
	♀	8400	2690	>5000

- (2) 亞急性毒性

Wistar 系大白鼠口服本劑 30 天之結果，發現甲狀腺重量隨投與量相對增加者外，服用 1500mg/kg 以上者體重增加曲線之異常，血球比容及血紅素之輕度降低，肝重量增加，胸腫重量減少。至於其他臨床化學檢查，尿檢查，內臟器官重量，組織學上檢查，則與對照群無顯著之差異。

- (3) 致畸型性

以 SD 系大白鼠服用 1500mg/kg 以上及 ICR 系小白鼠服 2500mg/kg 以上實驗之結果，各有發現口蓋裂之情況。

- (4) 眼刺激性

對家兔每 5 分鐘點眼 5 次之實驗結果，均無發現眼瞼，結膜充血，紅腫，眼脂分泌，及角膜障礙等不良現象。

【效能】

砂眼病原體，葡萄狀球菌，鏈鎖球菌，肺炎球菌，慢性結膜炎桿菌(Morax-Axenfeld

bacillus)，結膜炎桿菌(Koch-Weeks bacillus)之感染症。

【適應症】

結膜炎、砂眼、流行性角結膜炎、眼瞼炎、眼瞼緣炎、麥粒腫、淚囊炎、虹彩炎。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用

通常 1 日數次，1 次點眼數滴。視症狀得增減點眼次數。

【注意事項】

(1)一般注意：

使用中恐有致敏感作用者，應詳加觀察，萬一出現過敏時，請立即停藥。

(2)下列患者不得使用：

曾對磺胺劑發生過敏症之病人。

(3)下列患者須慎重使用：

對藥物有過敏症之病人。

(4)副作用：

1) 眼：有刺激感，眼瞼緣紅腫，結膜充血等，如出現此類症狀，應立即停藥。

2) 過敏症：出現過敏症狀時，應即停藥。

3) 長期連用：偶有出現相同於全身使用時之副作用，應請避免長期連續使用。

【貯存】

貯藏法：密蓋、阻光 25℃ 貯存。

【包裝】

100 公撮以下塑膠瓶裝。



應元化學製藥股份有限公司

台灣台南市安平工業區新忠路 26 號 TEL：(06) 2654883 (代表號)