

感冒膠囊

COLD CAPSULES

衛署藥製字 第 015740 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

版次 2

感冒是日常生活中最司空見慣的疾患，而其症狀不外乎是流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、發熱、頭痛等，既惹人討厭又損傷體力，重感冒尤其是小孩及年老體弱患者，更易引起併發症而發生危險，因而不得不加以留心診治。治療感冒症狀最有效的，自然是以含有多種成分作用之綜合感冒製劑，而一般之綜合感冒劑多少皆有其副作用存在，例如含Aspirin劑之損胃，含Pyrene劑之過敏及致癌作用，以及一般感冒製劑中最常使用之抗組織胺劑之嗜眠、頭暈副作用等等，這些都是以往綜合感冒劑之缺點，也是大家所最擔心的問題。Cold Capsules即是針對此一問題重新設計，效果好、副作用少，安全且不含抗組織胺劑之理想綜合感冒劑，早已盛行歐美，深獲好評。

【藥理作用】

1. Acetaminophen：安全有效之解熱鎮痛劑，能迅速發揮療效，不傷胃腸、副作用少，小孩亦可安心使用。
2. Glyceril Guaiacolate：化學合成之鎮咳祛痰劑，能液化膿痰，使之易於咳出，無耐受性、無習慣性。
3. Phenylephrine Hydrochloride：藥效顯著之鼻粘膜充血解除劑，能消除鼻塞及減少咽喉粘膜刺激。
4. Noscapine：由鴉片中分離提出之鎮咳良藥，能鎮靜呼吸中樞、弛緩支氣管平滑肌，具有極大之鎮咳作用，無成癮性、副作用少、持續力久。

1 成分

1.1 有效成分及含量

Each Capsule contains:

Acetaminophen.....300 mg

Glyceril Guaiacolate.....50 mg

Phenylephrine Hydrochloride.....5 mg

Noscapine..... 10 mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Avicel、New Coccine、Brilliant Blue FCF、PEG 6000

1.3 膠囊成分

Gelatin、New Coccin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF

2 用途(適應症)

感冒諸症狀(咽喉痛、咳嗽、喀痰、發熱、頭痛)之緩解。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

- 3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 3.1.2 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)期間，或停用MAOI兩星期內。如不了解服用之藥物是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。
- 3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治
- 3.2.1 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
- 3.2.2 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病（如慢性氣管炎或肺氣腫）所引起之持續或慢性咳嗽的人。
- 3.2.3 曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺肥大引起排尿困難。
- 3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生
- 3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 3.3.2 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
- 3.3.3 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
- 3.4 其他使用上注意事項
- 3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 3.4.2 避免陽光直射。
- 3.4.3 勿超過建議使用量。
- 3.4.4 不要服用本藥超過七日。
- 3.4.5 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
- 3.4.6 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen（Paracetamol）有急性肝衰竭的風險。

4 用法用量

年齡	劑量
成人及12歲以上	每次1粒，一日3次

5 警語

- 5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。

其他

喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生。

5.2.2 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。

5.2.3 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。

5.2.4 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。

5.2.5 服用過量[每日超過Acetaminophen 4,000毫克(mg)]，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。

5.2.6 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

6 包裝

6-1000粒塑膠罐裝、鋁箔盒裝。

7 儲存方式

請儲存於25°C以下。

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

製造廠

瑞士藥廠股份有限公司新市廠

台南市新市區中山路182號

藥商

瑞士藥廠股份有限公司

台南市新市區中山路182號