

骨多能 膠囊250毫克

Kudona Capsules 250mg

骨多能主要成分為結晶型硫酸鹽葡萄糖胺，為骨有機質、骨間質及骨關節內、外組織的重要成分。口服後經血液吸收，最後滲透進入關節腔中，約有 15 小時的長效作用。具有以下作用：

- 骨關節營養及促進新陳代謝
黏多醣為軟骨組織主要成分，結晶型硫酸鹽葡萄糖胺能促進黏多醣及間骨組織合成。
- 增加骨關節潤滑
結晶型硫酸鹽葡萄糖胺能改善關節滑囊液黏性、增加滑囊液。
骨多能對於減緩骨關節疼痛、改善骨關節機能、抑制骨關節退化並具有復原作用，對於退化性關節炎特別有效，適用於患有慢性關節炎的人。

[成分] 每粒膠囊中含有

有效成分及含量

Crystalline D-Glucosamine Sulfate.....314mg
(eq. to D-Glucosamine Sulfate 250mg and Sodium Chloride 64mg)

其他成分 (賦形劑)

Corn Starch, Lactose Monohydrate, Talc, Magnesium Stearate, Capsule(Gelatin, Glycerol, Sodium Laureth Sulfate, New Coccin, Tartrazine, Brilliant Blue FCF, Titanium Dioxide)

[用途 (適應症)]

緩解退化性關節炎之疼痛。

[使用上注意事項]

1. 有下列情形者，請勿使用
 - 曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - 嚴重肝腎疾病的人。
3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - 18 歲以下。
 - 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦
4. 其他使用上注意事項：
 - Glucosamine 屬病因治療，必須從開始治療後約一星期才有明顯的治療效果，因此當病情嚴重時，可從開始治療的第一天起，同時使用抗發炎藥物治療。
 - 請勿超過建議使用量。
 - 避免陽光直射。
 - 為防止兒童誤食，請妥善保管。

[用法用量]

關節炎症狀		使用劑量與頻次
輕微至中等程度		每天2次，每次2粒膠囊，飯前15分鐘服用。 連續治療6週。
嚴重程度 (關節疼痛)	初期治療	每天3次，每次2粒膠囊，飯前15分鐘服用。 連續治療至少8週。
	持續治療	每天2次，每次2粒膠囊，飯前15分鐘服用。 維持治療3~4個月。

[警語]

1. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	過敏反應，如發疹、搔癢等。
胃腸	偶有輕微而短暫之噁心、消化不良、嘔吐。

2. 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
- 若有上述外之其他不適情況產生。
 - 自覺狀況沒有改善或更惡化。

[包裝]

8 ~ 1000 粒塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

[類別]

醫師藥師藥劑生指示藥品。

[儲存]

儲存於25°C。

衛署藥製字第 G-6334
042350 號



委託者：健喬信元醫藥生技股份有限公司

303新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號

製造廠：優良化學製藥股份有限公司

303新竹縣湖口鄉中興村光復路10號



SLT0215R-03

VERSION NUMBER	SLT0215R-03-KUDONA250-CI-2020.05.21
REVISION DATE YYYY.MM.DD	2020.05.21
DIMENSIONS (MM) WIDTH * HEIGHT	105*150