



"永勝"

Code No. 187

宜胃錠

Iwell Tablets "EVEREST"

本劑中主成分之Dihydroxyaluminum allantoinate係西元1968年Turner應用於治療吐血患者之Allantoin經Cohen等合成之一連串Allantoin衍生物中之一種，該劑對肉芽組織有再生作用，對壞死組織具有清除作用，對炎症性粘膜炎具有保護作用，並能使傷口收斂，故被應用於消化性潰瘍療效頗佳，另再配合新制酸劑Metamagnesium alumino silicate具有適度之制酸作用，故能發揮兩種藥品之相加作用，誠為治療胃炎及消化性潰瘍之優異藥劑。

【成分】：每錠中含有：

Dihydroxyaluminum allantoinate50mg
Metamagnesium alumino silicate (Neusilin FH2)450mg

【作用特點】：

1. 本劑能促進微血管的再生，強化血管並改善患者血液的循環，故具有止血作用。
2. 本劑能清除壞死組織及其分泌物，促進新鮮肉芽組織之增殖，促進潰瘍面之癒合。
3. 本劑具有抑制Pepsin對消化管道之自體消化。
4. 本劑之制酸力極強，且在胃內之中和作用甚快，屬於速效性制酸作用，同時服用後能保持胃內酸度在最適宜之狀態(即PH 3~5之間)。
5. 本劑遇胃酸後有緩衝性作用，其反應生成物為非吸收性，故連用或大量使用亦不致引起類似Sodium bicarbonate之Alkalosis現象或因Alkali作用而發生之二次性酸分泌作用。
6. 本劑無Aluminum hydroxide gel之便秘作用，亦無Magnesium Carbonate之緩瀉等副作用。

【適應症】：胃酸過多、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、急、慢性胃炎。

【用法用量】：通常成人每次2錠，一日三次於飯後服用或依年齡適宜增減之。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
- 五、腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。

【警語】：

- 一、對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過5g。
- 二、未滿3個月之嬰幼兒不得服用。
- 三、如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
- 四、消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。

【賦形劑】：Corn Starch、Sucrose、Menthol、Strawberry Essence、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Sodium Saccharin、Erythrosine、Lactose、Povidone。

【包裝】：12~1000錠塑膠瓶、鋁箔盒裝、2000錠塑膠瓶裝。
儲藏(25°C)

衛署藥製字第045031號



嘉義頭橋工業區工業三路6-3號
諮詢電話:05-2218686(代表號)