



"晟德"希普利敏液0.4毫克/毫升

Cypromin Solution 0.4mg/ml "Center"

衛署藥製字 第 043588 號

須由醫師處方使用

版本日期 2024-05-08

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每毫升(ml)含有

Cyproheptadine Hydrochloride0.4 mg

1.2 賦形劑

香草牛奶: Alcohol, Sucrose, Methylparaben, Vanillin, Citric Acid Anhydrous, Essence of Milk, Water Purified.

鳳梨口味: Alcohol, Sucrose, Methylparaben, Citric Acid Anhydrous, Tartrazine, Pineapple Flavor, Water Purified.

1.3 劑型

內服液劑

1.4 藥品外觀

香草牛奶:透明澄清溶液。

鳳梨口味:黃色澄清溶液。

2 適應症

皮膚疾患引起之搔癢(濕疹、皮膚炎、皮膚搔癢症、藥物過敏反應)、枯草熱、蕁麻疹、過敏性鼻炎、血管運動性鼻炎、感冒支氣管炎引起之咳嗽、鼻涕。

3 用法及用量

3.1 用法用量

本藥須由醫師處方使用

成人: 治療範圍一般每天10~50毫升, 大部分病患用量為每天30~40毫升, 視病情可加重至每天80毫升, 建議初始用者每日3次, 每次10毫升, 每天最多不超過0.5mg/kg體重。

7-14歲孩童: 每日2~3次, 每次10毫升, 每天最多不超過40毫升。

2-6歲孩童: 每日2~3次, 每次5毫升, 每8~12小時一次, 每天最多不超過30毫升。

4 禁忌

4.1 新生兒、早產兒、授乳之母親及對Cyproheptadine或MAOI敏感者禁止使用本藥。

4.2 青光眼、前列腺肥大、氣喘、幽門狹窄、年老虛弱之病人禁用本藥。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

國內外曾有2歲以下幼兒使用第一代抗組織胺口服劑型藥品後導致嚴重傷害（如中樞神經功能障礙等）之案例報告。目前並無明確證據顯示兒童使用第一代抗組織胺藥品之效益，本品應謹慎使用於6歲以下兒童族群。

5.3 操作機械能力

服用本藥應避免開車或操作機械。

6 特殊族群注意事項

6.4 小兒

6.4.1 二歲以下兒童之用量尚未建立。

6.4.2 小孩或嬰兒服用過量會造成嗜睡、中樞神經抑制、痙攣和死亡。

6.5 老年人

老年人服用本藥易造成眩暈、鎮靜和低血壓。

7 交互作用

7.1 本藥與酒精或中樞神經抑制劑併用，具加乘作用。

7.2 MAO inhibitors會延長並加強乙醯膽鹼效果。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

8.1.1 嗜眠、噁心、下痢、腹痛、頻尿等。

8.1.2 在血液方面有：紫斑、血小板減少、白血球減少之現象。

8.1.3 過敏症狀：發疹、水腫、蕁麻疹、對光敏感。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

本藥具有抗乙醯膽鹼和鎮靜的功能，為Serotonin及組織胺的拮抗劑，對一般之過敏反應有療效。

10.2 藥效藥理特性

請參閱10.1。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

113.05.08

13 包裝及儲存

13.1 包裝

60-4000毫升塑膠瓶裝。

13.2 效期

如包裝所示。

13.3 儲存條件

請密封儲存於25°C以下，毋須冰存並避免陽光直射。

13.4 儲存注意事項

本品應置於兒童不及之處。

製造廠

新竹縣湖口鄉實踐路2號

新竹縣湖口鄉實踐路2號

藥商

晟德大藥廠股份有限公司新竹廠

新竹縣湖口鄉實踐路2號、光復北路21巷1號